

```

                                script_Descr2011-12.R
# -----#
# Script de apoio a uma possivel resolucao dos exercicios de Introducao ao R
# e Estatistica Descritiva
# Todas as linhas que comecam com # sao comentarios
# Esta resolucao pressupoe que os ficheiros necessarios se encontram na area
# de trabalho do R
# -----#
# -----#
## Exercicio 1.1
# -----#
#a)
Ano0<-c(68, 88, 101, 82, 96, 74, 65, 74, 52, 99)
Ano1<-c(67, 87, 90, 76, 98, 69, 68, 65, 59, 70)
#b)
length(Ano0);length(Ano1)
#c)
dif<-Ano0-Ano1;dif
#d)
posdif<-dif[dif>0];posdif
#
# -----#
## Exercicio 1.2
# -----#
#a)
nomes<-c("Maria", "Joao", "Tome", "Catarina")
idades<-c(20,18,21,19)
alturas<-c(165,159,180,192)
#b)
cartac<-c(T,F,T,F)
#c)
max_id<-max(idades);max_id
min_id<-min(idades);min_id
#d)
media_alt<-mean(alturas);media_alt
nomes[alturas>media_alt]
#e)
nomes[cartac]
length(nomes[cartac])
#f)
colegas<-data.frame(nome_c=nomes,idade_c=idades,altura_c=alturas,carta_c=carta
c)
colegas #para visualizar a tabela que construimos
attach(colegas)
mean(altura_c)
detach(colegas)
#
# -----#
## Exercicio 1.3
# -----#
#a)
conc<-read.table("concelho.txt",header=T,sep=" ",as.is=T)
conc
attach(conc)
#b)
nomec[numfreg==max(numfreg)]
#c)
totc<-length(nomec)
totc
#d)
dist<-table(nomed)
dist
#e)

```

```

plot(dist)
barplot(dist)
#f)
mean(dist)
detach(conc)
#
# -----#
## Exercício 1.4
# -----#
#a)
v<-sample(1:6,30,rep=T);v
#b) e c)
vbar<-sum(v)/30;vbar
mean(v) #verifique que da o mesmo
var(v)
s2<-sum((v-vbar)^2)/29; s2 #o resultado ´e o mesmo
#Note-se que obteria um resultado diferente se fizesse
s2exp<-sum(v-vbar)^2/29;s2exp
#d)
table(v)
par(mfrow=c(2,2))# vamos dividir a janela gráfica em 4
plot(table(v))
w1<-sample(1:6,300,rep=T)
table(w1)
plot(table(w1))
w2<-sample(1:6,3000,rep=T)
w2
table(w2)
plot(table(w2))
# -----#
#Exercício 1.5
# -----#
load("SementesOzono.Rdata")
sementes
ozono
mean(sementes)
mean(ozono)
# -----#
#Exercício 1.6
# -----#
load("DadosMeteo.Rdata")
precip
temp
vento
# a)
length(precip[is.na(precip)])
length(temp[is.na(temp)])
length(vento[is.na(vento)])
#
# b)
#indicadores localização
summary(precip); summary(temp); summary(vento)
# indicadores de dispersão
max(precip)-min(precip)
max(temp,na.rm=T)-min(temp,na.rm=T)
max(vento)-min(vento)
quantile(precip, probs =0.75,type = 2)-quantile(precip, probs =0.25,type = 2)
quantile(temp, probs =0.75,na.rm=T,type = 2)-quantile(temp, probs
=0.25,na.rm=T,type = 2)
quantile(vento, probs =0.75,type = 2)-quantile(vento, probs =0.25,type = 2)
var(precip); var(temp, na.rm=T); var(vento)
sd(precip); sd(temp, na.rm=T); sd(vento)

```

script_Descr2011-12.R

```

#
# -----#
#Exercicio 1.8
# -----#
# a)
nematodos<-read.table("nematodos.txt", header=T) # leitura
ni<-table(nematodos$numero) # frequência absoluta
fi<-ni/sum(ni) # frequência relativa
Fi<-cumsum(fi) # frequência relativa acumulada
Ni<-cumsum(ni) # frequência absoluta acumulada
cbind(ni,fi,Fi,Ni) # tabela de frequências
plot(ni) # grafico de barras
#
# b)
laranjas<-read.table("laranjas.txt",header=T)
table(laranjas$numero) #numero de valores distintos muito elevado
# histograma construído pelo R sem indicação das classes
hist(laranjas$numero)
# histograma com classes definidas pelo utilizador
numSturges<-round(1+log2(length(laranjas$numero))) # regra Sturges
max(laranjas$numero)
min(laranjas$numero)
(max(laranjas$numero)-min(laranjas$numero))/numSturges # amplitude aproximada
de cada classe
hist.laranjas <- hist(laranjas$numero,breaks=c(130,160,190,220,250,280,310)) #
apresenta o histograma e guarda informação utilizada na sua construção
# visualização simultânea dos dois histogramas
op<-par(mfrow=c(1,2))
hist(laranjas$numero, main="histograma R")
plot(hist.laranjas, main="histograma utilizador")
attach(hist.laranjas)
ni<-counts
fi<-ni/sum(ni)
Fi<-cumsum(fi)
Ni<-cumsum(ni)
nclass<-length(ni)
esq<-breaks[1:nclass]
dir<-breaks[2:(nclass+1)]
data.frame(esq,dir,ni,fi,Fi,Ni)
detach(hist.laranjas)
par(op)
#
# c)
ovelhas<-read.table("ovelhas.txt",header=T)
ovelhas
hist.ovelhas <- hist(ovelhas$peso)
attach(hist.ovelhas)
ni<-counts
fi<-ni/sum(ni)
Fi<-cumsum(fi)
Ni<-cumsum(ni)
esq<-breaks[1:length(ni)]
dir<-breaks[2:(length(ni)+1)]
data.frame(esq,dir,ni,fi,Fi,Ni)
detach(hist.ovelhas)
#
# -----#
#Exercicio 1.13
# -----#
inquerito<-read.table("inquerito.csv",header=T,sep="," ,as.is=T)
inquerito
attach(inquerito)

```

```

idade
sexo
altura
nivel
idade_tab<-table(idade)
idade_tab
sexo_tab<-table(sexo)
sexo_tab
nivel_tab<-table(nivel)
par(mfrow=c(2,2))
plot(idade_tab)
plot(sexo_tab)
hist(altura)
plot(nivel_tab)
detach(inquerito)
#
# -----#
#Exercicio 1.14
# -----#
load("Serras.RData")
serras
# a)
# vamos comparar histogramas com diferentes agrupamentos em classes
# histograma construído pelo R sem indicação das classes
op<-par(mfrow=c(2,2))
hist(serras)
# histogramas com classes definidas pelo utilizador
numSturges<-round(1+log2(length(serras))) # regra Sturges número de classes
numSturges
max(serras)
min(serras)
(max(serras)-min(serras))/numSturges # amplitude aproximada de cada classe
hist(serras,breaks=seq(250,2000,by=250),main="amplitude 250, começa em 250")
hist(serras,breaks=seq(290,2280,by=280), main="amplitude 280")
hist(serras,breaks=seq(200,2200,by=250),main="amplitude 250, começa em 200")
par(op)
#
# -----#
#Exercicio 1.15
# -----#
#d)
precip<-c(0,0,0,0,4.7,0.6,17.2,1.4,11.2,1,3.8,0.3,0,0,0.5,7,0,0,3.3,7.6,0.9,0.
3,18.2,4,4.6,22,15.6,0,3.4,0,0)
# visualização simultânea de histograma e caixa de bigodes
op<-par(mfrow=c(1,2))
# histograma construído pelo R sem indicação das classes
hist(precip)
boxplot(precip) # caixa de bigodes
par(op)
mean(precip)
median(precip)
#
# -----#
#Exercicio 1.19
# -----#
golfinho <- c(rep(0,17), rep(1,45), rep(2,84), rep(3,52), rep(4,23),
rep(5,11), rep(6,2), rep(8,1))
#b)
ni<-table(golfinho)
fi<-ni/sum(ni)
Fi<-cumsum(fi)
cbind(ni,fi,Fi)

```

```

plot (table(golfinho))
#c)
#medidas de localizacao
mean(golfinho); quantile(golfinho,type=2)
#medidas de dispersao
var(golfinho); sd(golfinho); max(golfinho)-min(golfinho)
quantile(golfinho,probs=0.75,type=2)-quantile(golfinho,probs=0.25,type=2)
#d)
Fi[3]
#
# -----#
#Exercicio 1.20
# -----#
#c)
load("FluxoCalor.RData")
ls()
fluxoCalor
attach(fluxoCalor)
total<-c(DIA1,DIA2,DIA3)
max(total)
min(total)
op<-par(mfrow=c(1,2))
hist(total,breaks=seq(-450,0,by=50),main="hist 1")
hist(total,breaks=seq(-425,25,by=50),main="hist 2")
par(op)
# tabela de frequencias
hist.total<-hist(total,breaks=seq(-425,25,by=50),plot=F)
attach(hist.total)
ni<-counts
fi<-ni/sum(ni)
Fi<-cumsum(fi)
data.frame(mids,ni,fi,Fi)
detach(hist.total)
#
# -----#
#Exercicio 1.23
# -----#
load("Cor.RData")
cor
table(cor$olhos,cor$cabelos)
tabela.cor<-table(cor$olhos,cor$cabelos)
addmargins(tabela.cor) #acrescenta as frequencias marginais
#apenas as frequencias marginais
margin.table(tabela.cor,1)
margin.table(tabela.cor,2)
#
# -----#
#Exercicio 1.29
# -----#
load("CalorEspecifico.RData")
attach(caloresp)
#a)
boxplot(y,horizontal=TRUE)
#b)
cor(x,y) # coeficiente de correlacao entre x e y
regres<-lm(y~x)
regres
summary(regres) # da informacao mais detalhada sobre a
#recta de regressao de y sobre x
#c)
predict(regres,data.frame(x=60))
#d)

```

```
y.linha <- (y+600)/1000
summary(lm(y.linha~x))
detach(caloresp)
# -----#
#Exercicio 1.34
# -----#
anscombe
attach(anscombe)
#a)
mean(x1);mean(x2);mean(x3);mean(x4)
var(x1);var(x2);var(x3);var(x4)
#b)
cor(x1,y1);cor(x2,y2);cor(x3,y3);cor(x4,y4)
#c)
reg1<-lm(y1~x1)
reg1
reg2<-lm(y2~x2)
reg2
reg3<-lm(y3~x3)
reg3
reg4<-lm(y4~x4)
reg4
#d)
par(mfrow=c(2,2))
plot(x1,y1);abline(reg1)
plot(x2,y2);abline(reg2)
plot(x3,y3);abline(reg3)
plot(x4,y4);abline(reg4)
#e)
plot(x1,residuals(reg1))
plot(x2,residuals(reg2))
plot(x3,residuals(reg3))
plot(x4,residuals(reg4))
detach(anscombe)
#
```